

BOLLETTINO NOCCIOLO NR. 2 - Campagna 2015

Misura 214.1 e 214.2

- **Fase fenologica: “ fine Ingrandimento dei frutticini”**

A seguito dei numerosi rilievi nei nocciolieti monitorati da più di un mese a questa parte da cui non sono mai risultate superate le soglie di danno, non sono stati dati sino ad ora indicazioni generiche di interventi specifici. Anche se da altri centri di assistenza sono state date indicazioni diverse, solo ora la presenza delle cimici nei nocciolieti ha cominciato ad essere preoccupante e risulta evidente che i trattamenti consigliati ed eseguiti prima di oggi, non sono stati sufficienti per un buon controllo dei pentatomidi; si precisa che la cascola che ha interessato alcuni nocciolieti non è dovuta alle punture di cimice, bensì alla mancata impollinazione della fioritura femminile molto tardiva che ha interessato diverse aree corilicole (per mancanza ormai di polline maschile).

Dai monitoraggi effettuati nei diversi areali corilicoli risulta ora una presenza continua ed in aumento del numero di adulti e neanidi di *Gonocerus*, *Palomena* e soprattutto *Nezzara* (che è peraltro la meno dannosa). Si consiglia pertanto di eseguire un trattamento insetticida per contenere i danni sul gheriglio; danni che possono ancora essere sia quantitativi che qualitativi, in quanto, al contrario di come si sente spesso dire da corilicoltori ed anche alcuni tecnici, alcuni pentatomidi sono in grado di perforare i gusci delle nocciole, anche quando questi sono induriti e ben maturi..

Le sostanze attive suggerite da impiegare sono in alternativa:

LAMBDA CIALOTRINA (karate zeon)

ETOFENPROX (trebon)

INDOXACARB (steward)

- In previsione di un persistere del clima estivo ed entro la fase fenologica di “fine accrescimento **del seme**” si consiglia di integrare al trattamento insetticida, un fertilizzante fogliare a base di fosfiti di potassio in modo da favorire la perfetta maturazione del seme



FEASR

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.
L'Europa investe nelle zone rurali



Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Misura 111 - Sottoazione B
Informazione nel settore agricolo

ed il suo pieno sviluppo. In presenza di attacchi di oidio, aggiungere alla miscela anche uno **zolfo bagnabile o liquido** al dosaggio riportato in etichetta

N.B. Usare solo preparati commerciali registrati su nocciolo

Si rammenta infine di utilizzare volumi d'acqua adeguati all'età delle piante (800-1000 litri ogni ettaro per i noccioli di età pari a 8/10 anni).

13.07.2015

Per maggiori chiarimenti contattare il tecnico.

Cordiali saluti
MONDAGRI COOP



FEASR

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.
L'Europa investe nelle zone rurali



Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Misura 111 - Sottoazione B
Informazione nel settore agricolo