


BOLLETTINO VITE N. 4 - Campagna 2017 - del 07/06/2017



Peronospora: non si prevedono precipitazioni almeno fino al 15 giugno, è consigliabile mantenere la copertura in quanto le centraline meteo ci segnalano una forte bagnatura fogliare anche in assenza di precipitazioni.

Oidio, A fine fioritura e nella fase “grani di pepe” e bene mantenere la copertura antioidica mediante l’impiego di antioidici specifici quali: ANTIOIDICI SISTEMICI (IBE) METRAFENONE, CIFLUFENAMID, SPIROXAMINA STROBILURINE (dosi riportate in etichetta) Si consiglia di miscelare all'antiperonosporico un prodotto eventualmente miscelato a un prodotto di copertura a base di Zolfo alla dose di 150-200 gr/. Da valutare in alternativa l’escuzione di un trattamento con zolfo in polvere alla dose di 25-35 Kg/ha .

FLAVESCENTZA DORATA DELLA VITE

(decreto ministeriale del 31/05/2000 “Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite”)

NON TRATTARE

DURANTE LA FIORITURA DELLA VITE

**Occorre attendere la fine del periodo di fioritura della vite e
l'avvenuta allegazione**

Aziende biologiche: il primo trattamento dovrà essere effettuato con piretro o con sali potassici degli acidi grassi subito dopo la fine della fioritura e ripetuto ogni 7-10 giorni.

Aziende convenzionali che intendono utilizzare il **Buprofezin** il trattamento dovrà essere effettuato subito dopo la fine della fioritura, entro una settimana dalla fine della stessa.

Aziende convenzionali che non utilizzano il **Buprofezin** non devono ancora trattare e seguirà apposito comunicato.

ACCORGIMENTI

- Controllare il pH della soluzione in modo che sia inferiore a 7.
- Impiegare volumi di acqua e pressioni di distribuzione in grado di bagnare bene tutta la vegetazione.
- Trattare tutti i filari da entrambi i lati.
- Cercare di far arrivare la soluzione sulla pagina inferiore delle foglie, comprese quelle dei polloni.
- Evitare presenza di polloni o erbe infestanti troppo sviluppate alla base dei ceppi.

Salvaguardia degli insetti pronubi

(Legge regionale 3/8/98, n. 20)

- Divieto trattamenti insetticidi in fioritura.
- Sfalcio e appassimento/asportazione della vegetazione sottostante nel caso di presenza di fioriture spontanee prima di eseguire i trattamenti insetticidi.
- Evitare fenomeni di deriva (non trattare in presenza di vento).

Per maggiori chiarimenti contattare il tecnico.

Cordiali saluti
MONDAGRI COOP