

BOLLETTINO NOCCIOLO N. 5 - Campagna 2017 - del 18/07/2017

Fase fenologica: “ inizio maturazione frutti “.

Cimici :

In conseguenza agli ultimi rilievi fatti si evidenzia un consistente aumento del numero di uova , neanidi e adulti. Si consiglia pertanto di eseguire tempestivamente un trattamento insetticida, a partire dai nocciolati di fondovalle, proseguendo con quelli in metà collina e finendo con quelli in alta langa nei giorni seguenti , per contenere sia il numero di individui che i danni sul gheriglio (già presenti) sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo .

Le sostanze attive suggerite da impiegare sono in alternativa

- LAMBDAHALOTRINA
- ETOFENPROX
- ACETAMIPRID
- INDOXACARB (previsto un solo trattamento l' anno)
- ESTRATTO DI PIRETRO per la difesa dei nocciolati in regime di agricoltura Biologico

Si consiglia di non ripetere i trattamenti con principi attivi già utilizzati in precedenza per aumentare l' efficacia degli stessi .

Nel caso dell' indoxacarb (nome commerciale steward) è consentito un solo trattamento l' anno quindi può essere utilizzato solo nel caso in cui non sia stato impiegato nei trattamenti precedenti .

In deroga alle norme tecniche di produzione integrata per l'operazione 10.1.1 del PSR 2014-2020 Epik SL per la lotta contro *Halymorpha halys* (cimice asiatica) su nocciolo per il periodo dal 10 maggio 2017 al 6 settembre 2017



Oidio :

- In conseguenza agli ultimi rilievi fatti si è riscontrato un attacco di oidio pertanto si consiglia di aggiungere alla miscela anche uno zolfo bagnabile o liquido al dosaggio minimo riportato in etichetta, come difesa preventiva. N.B. Usare solo preparati commerciali registrati su nocciolo. Si rammenta infine di utilizzare volumi d'acqua adeguati all'età delle piante (800-1000 litri ogni ettaro per i noccioli di età pari a 8/10 anni).

Per maggiori chiarimenti contattare il tecnico.

Cordiali saluti
MONDAGRI COOP