

BOLLETTINO NOCCIOLO N. 4 - Campagna 2017 - del 06/07/2017

Fase fenologica: “Riempimento dei frutticini”.

Cimici :

In conseguenza dell' andamento climatico estivo anticipato e agli ultimi rilievi fatti si evidenzia un consistente aumento del numero di neanidi . Viste le dimensioni rapidamente raggiunte dai semi , si consiglia pertanto di eseguire un trattamento insetticida, a partire dai noccioli di fondovalle , proseguendo con quelli in alta langa nei giorni seguenti , per contenere i danni sul gheriglio sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo .

Le sostanze attive suggerite da impiegare sono in alternativa

- LAMBDAALOTRINA
- ETOFENPROX
- ACETAMIPRID
- ESTRATTO DI PIRETRO per la difesa dei noccioli in regime di agricoltura Biologico

In deroga alle norme tecniche di produzione integrata per l'operazione 10.1.1 del PSR 2014-2020 Epik SL per la lotta contro *Halyomorpha halys* (cimice asiatica) su nocciolo per il periodo dal 10 maggio 2017 al 6 settembre 2017



- Nei nocciuoli dove negli anni scorsi si sono verificati forti attacchi di oidio, aggiungere alla miscela anche uno zolfo bagnabile o liquido al dosaggio minimo riportato in etichetta, come difesa preventiva. N.B. Usare solo preparati commerciali registrati su nocciolo. Si rammenta infine di utilizzare volumi d'acqua adeguati all'età delle piante (800-1000 litri ogni ettaro per i nocciuoli di età pari a 8/10 anni).

Per maggiori chiarimenti contattare il tecnico.

Cordiali saluti
MONDAGRI COOP

